

Cuando a su hijo se le diagnostica TDAH



Elija: Constancia

Descubra medicamentos que funcionen con el perfil único de su hijo para un control constante y predecible de los síntomas

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Quillivant XR® (HCl de metilfenidato) y QuilliChew ER® (HCl de metilfenidato)?

Quillivant XR y QuilliChew ER son sustancias controladas federalmente (clasificación CII) porque pueden ser objetivo de personas que abusan de medicamentos de venta con receta o drogas adictivas. Quillivant XR y QuilliChew ER están sujetos a una alta probabilidad de abuso y uso indebido, y pueden causar problemas de consumo de sustancias, incluida la adicción. **Guarde los medicamentos en un lugar seguro para prevenir el abuso y el uso indebido.** Nunca entregue su Quillivant XR o QuilliChew ER a otra persona, ya que puede causarle daños o la muerte. **Vender o regalar estos medicamentos puede dañar a otras personas y está penado por la ley.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).



Acerca del TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes que se presentan en la infancia.¹ Según un estudio realizado en EE. UU. en el 2022 entre niños de 3 y 17 años:

~11% ha tenido un diagnóstico de TDAH²

~54% de los niños con TDAH en curso toman medicamentos para controlar los síntomas²

Sin embargo, encontrar el medicamento adecuado puede ser difícil. En un estudio reciente se descubrió lo siguiente:

~60% de los niños y adolescentes cambiaron sus tratamientos para el TDAH en un período de 12 meses³

Como padre o madre de un niño con TDAH, usted sabe lo importante que es la constancia de su rutina diaria.⁴

Obtenga más información en este folleto sobre **Quillivant XR** (HCl de metilfenidato) y **QuilliChew ER** (HCl de metilfenidato), dos medicamentos en los que puede confiar para combatir el TDAH y que funcionan según el perfil único de su hijo con el fin de proporcionar un control constante de los síntomas.

Su proveedor de atención médica debe evaluar el riesgo de abuso, uso indebido y adicción de usted o de su hijo antes de comenzar el tratamiento con Quillivant XR o QuilliChew ER, y los supervisará a usted o a su hijo durante el tratamiento. Si usted, su hijo o algún familiar han abusado alguna vez del alcohol, de medicamentos de venta con receta o de drogas adictivas, o han sido dependiente de estos, infórmeles a su médico.

No se debe tomar Quillivant XR y QuilliChew ER si usted o su hijo son alérgicos al clorhidrato de metilfenidato o a cualquiera de los ingredientes de QuilliChew ER, o si están tomando o han tomado en los últimos 14 días un medicamento antidepresivo llamado inhibidor de la monoaminoxidasa o IMAO.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).



DOS FORMULACIONES para satisfacer las necesidades específicas de su hijo.
UNA TECNOLOGÍA ÚNICA que funciona según el perfil único de su hijo.



Liberación **continua** durante los momentos más importantes del día^{5,6,7}



Administración **constante** y óptima del fármaco⁵



Control **predecible** y duradero de los síntomas^{6,7}

¿Cómo funciona nuestra tecnología?

Un revestimiento especial en las moléculas del fármaco **protege** al metilfenidato hasta que está listo para liberarse, de modo que las diferencias en el metabolismo de su hijo o los cambios en su dieta no afecten la forma en que el medicamento se libera durante día.⁵

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Se han informado los siguientes casos con el uso de clorhidrato de metilfenidato y otros medicamentos estimulantes:

- **Problemas relacionados con el corazón:**

- Muerte súbita en pacientes que tienen problemas o defectos cardíacos.
- Accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos en adultos.
- Aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
- El proveedor de atención médica debe controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca de usted o de su hijo regularmente durante el tratamiento con Quillivant XR o QuilliChew ER.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).

Conozca la solución oral de Quillivant XR (HCl de metilfenidato)

Ayuda a controlar los síntomas desde la mañana hasta el resto del día⁷

Control continuo de los síntomas durante 12 horas⁷

- Mejora duradera de la atención y el comportamiento⁷

Administración constante del medicamento

- Liberación continua y óptima del metilfenidato durante todo el día⁵
- La liberación no se ve afectada por el consumo de alimentos o por el metabolismo del metilfenidato⁵

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Problemas mentales (psiquiátricos):**
 - Trastornos del comportamiento y del pensamiento recientes o agravados.
 - Trastorno bipolar de aparición reciente o agravado.
 - Se pueden producir nuevos síntomas psicóticos (como escuchar voces, creer cosas que no son ciertas y sentir desconfianza) o nuevos síntomas maníacos.
- **Problemas de circulación en los dedos de las manos y de los pies (vasculopatía periférica, incluido el fenómeno de Raynaud):**
 - Los dedos de las manos o de los pies pueden doler, sentirse entumecidos o fríos, o cambiar de color de pálido a azul y a rojo.

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si usted o su hijo tienen los siguientes síntomas:

- **Síntomas relacionados con el corazón, como dolor de pecho, dificultad para respirar o desmayos.**
- **Síntomas mentales (psiquiátricos) nuevos o agravados o síntomas maníacos nuevos.**
- **Signos de heridas inexplicables que aparecen en los dedos de las manos o de los pies mientras toma Quillivant XR o QuilliChew ER.**

Es posible que Quillivant XR o QuilliChew ER no sean adecuados para usted o su hijo. Antes de comenzar el tratamiento con Quillivant XR, infórmele a su proveedor de atención médica o al de su hijo sobre todas las afecciones de salud, incluidas las siguientes opciones:

- Problemas cardíacos, enfermedades cardíacas, defectos cardíacos o presión arterial alta.
- Problemas de salud mental, incluida la psicosis, la manía, el trastorno bipolar o la depresión.
- Problemas de circulación en los dedos de las manos y de los pies.
- Problemas oculares, como aumento de la presión ocular, glaucoma o problemas de visión con los objetos cercanos (hipermetropía).
- Movimientos o sonidos repetidos (tics), síndrome de Tourette o antecedentes familiares de tics o síndrome de Tourette.


Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).



Dosificación personalizada en un líquido de acción prolongada⁸

Quillivant XR líquido permite a su médico ajustar semanalmente la dosis a una mayor o menor en cantidades de 2 a 4 mL.⁸

- Quillivant XR incluye un dosificador oral para ayudarlo a medir la cantidad correcta de medicamento
- Quillivant XR se puede tomar con o sin alimentos
- Tome Quillivant XR exactamente como se le recetó y recuerde que DEBE agitar enérgicamente el frasco durante, al menos, 10 segundos antes de cada uso



Consulte las Instrucciones de Uso en la Información Completa de Prescripción incluida en el bolsillo de este folleto para obtener instrucciones específicas sobre cómo su hijo debe tomar Quillivant XR.

O visita www.trisadhd.com/quillivant-xr/taking-quillivant-xr/

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Es posible que Quillivant XR (HCl de metilfenidato) o QuilliChew ER (HCl de metilfenidato) no sean adecuados para usted o su hijo. Antes de comenzar el tratamiento con Quillivant XR, infórmele a su proveedor de atención médica o al de su hijo acerca de todas las afecciones de salud, incluidas las siguientes opciones (continuación):

- Fenilcetonuria (FCU). Los comprimidos masticables de liberación prolongada de QuilliChew ER contienen fenilalanina como parte del edulcorante artificial aspartamo. El edulcorante artificial puede ser nocivo para las personas con FCU o que son alérgicas a la fenilalanina.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si Quillivant XR o QuilliChew ER son dañinos para los fetos. Existe un registro de embarazos para mujeres que estuvieron expuestas a QuilliChew ER durante el embarazo. El objetivo del registro es recopilar información sobre el estado de salud de las mujeres y sus bebés expuestos a Quillivant XR o QuilliChew ER. Si usted o su hija queda embarazada durante el tratamiento con QuilliChew ER, hable con su proveedor de atención médica con el fin de inscribirse en el Registro Nacional de Embarazos para Psicoestimulantes llamando al 1-866-961-2388 o visitando <https://womensmentalhealth.org/clinical-and-research-programs/pregnancyregistry/othermedications/>.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).

Conozca los comprimidos QuilliChew ER (HCl de metilfenidato)

Cuando los comprimidos son la opción preferida para su hijo

Control eficaz de los síntomas⁶

- Funciona durante los momentos más importantes del día⁶
- Mejoras duraderas de la atención y el comportamiento⁶

Administración constante, sin importar que se mastique o se trague⁹

- Liberación continua y óptima del medicamento⁵
- La liberación no se ve afectada por el consumo de alimentos o por el metabolismo del metilfenidato⁵

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Es posible que Quillivant XR (HCl de metilfenidato) o QuilliChew ER (HCl de metilfenidato) no sean adecuados para usted o su hijo. Antes de comenzar el tratamiento con Quillivant XR, infórmelo a su proveedor de atención médica o al de su hijo acerca de todas las afecciones de salud (o antecedentes familiares de afecciones), incluidas las siguientes opciones (continuación):

- Si está amamantando o tiene previsto hacerlo. Quillivant XR y QuilliChew ER se transfieren a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si va a tomar QuilliChew ER o va a amamantar.

No comience a tomar ningún medicamento nuevo mientras esté tomando Quillivant XR o QuilliChew ER sin antes hablar con su proveedor de atención médica.

¿Qué debo evitar mientras tomo Quillivant XR o QuilliChew ER?

Quillivant XR y QuilliChew ER no deben tomarse junto con medicamentos IMAO; tampoco deben tomarse si dejó la administración de un IMAO en los últimos 14 días. No beba alcohol mientras esté tomando Quillivant XR o QuilliChew ER. Esto puede causar una liberación más rápida de la dosis de metilfenidato.

Quillivant XR o QuilliChew ER pueden causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Quillivant XR o QuilliChew ER?” para obtener información sobre los problemas cardíacos y mentales notificados.

Entre otros efectos secundarios graves, se incluyen los siguientes:

- **Tics nuevos o agravados o síndrome de Tourette agravado.** Infórmelo a su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan tics nuevos o agravados o síndrome de Tourette agravado durante el tratamiento con **Quillivant XR o QuilliChew ER**.
- Con el metilfenidato, **se han producido erecciones dolorosas y prolongadas (priapismo)**. Si usted o su hijo desarrollan priapismo, busque ayuda médica de inmediato. **Debido a que el priapismo puede causar daños duraderos, se debe recurrir a un médico de inmediato para una revisión.**

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).



Dosificación personalizada para su hijo

QuilliChew ER debe tomarse por vía oral una vez al día por la mañana.

- El comprimido se puede masticar o tragar completo⁹
- Se puede tomar con o sin alimentos

11 opciones de dosificación¹⁰

- Los comprimidos de 20 mg y 30 mg son ranurados¹⁰
 - Los comprimidos ranurados se pueden dividir en partes iguales para permitir opciones de dosificación adicionales y alcanzar la dosis específica recomendada por su proveedor de atención médica¹⁰
 - El comprimido de 20 mg se puede dividir en mitades iguales de 10 mg, y el comprimido de 30 mg se puede dividir en mitades iguales de 15 mg¹⁰
 - El comprimido de 40 mg no es ranurado¹⁰



O visita www.trisadhd.com/quillichew-er/taking-quillichew-er/

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

- **Ralentización del crecimiento (estatura y peso) en los niños.** Durante el tratamiento con Quillivant XR (HCl de metilfenidato) o QuilliChew ER (HCl de metilfenidato), se deben medir con frecuencia la estatura y el peso de los niños. El tratamiento con Quillivant XR o QuilliChew ER puede interrumpirse si su hijo no está aumentando su peso o estatura.
- **Problemas oculares (aumento de la presión ocular y glaucoma).** Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si usted o su hijo presentan cambios en la visión o dolor, inflamación o enrojecimiento de los ojos.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el **RECUADRO DE ADVERTENCIA** sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).

¿Listo para cambiar?

Hable con su médico sobre si su hijo está listo para pasar de un medicamento líquido a un comprimido masticable.

Tanto **Quillivant XR** (HCl de metilfenidato) como **QuilliChew ER** (HCl de metilfenidato) utilizan la misma tecnología de administración única, por lo que, sea cual sea la formulación que elija, puede esperar los siguientes beneficios:

- Administración constante del medicamento para el TDAH⁵
- Control eficaz de los síntomas del TDAH^{6,7}

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Efectos secundarios más comunes:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| - Disminución del apetito | - Dolor de estómago | - Cambios de humor |
| - Problemas para dormir | - Pérdida de peso | - Ritmo cardíaco acelerado |
| - Náuseas | - Ansiedad | - Aumento de la presión arterial |
| - Vómitos | - Mareos | |
| - Indigestión | - Irritabilidad | |

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Quillivant XR y QuilliChew ER.

Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) llamando al 1-800-FDA-1088.

USO APROBADO


Quillivant XR (HCl de metilfenidato) y **QuilliChew ER** (HCl de metilfenidato) son medicamentos con receta estimulantes del sistema nervioso central.

Quillivant XR es un medicamento líquido que se toma por vía oral. **QuilliChew ER es un comprimido masticable.**

Quillivant XR y QuilliChew ER se utilizan para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Quillivant XR y QuilliChew ER pueden ayudar a aumentar la atención y disminuir la impulsividad e hiperactividad en personas con TDAH.

Quillivant XR y QuilliChew ER no se recomiendan para su uso en niños menores de 6 años con TDAH.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).



DOS FORMULACIONES para satisfacer las necesidades específicas de su hijo.

UNA TECNOLOGÍA ÚNICA que funciona según el perfil único de su hijo.



Eficacia durante los momentos más importantes del día^{6,7}



Mejora **duradera** de la atención y el comportamiento^{6,7}

Si va a cambiar entre **Quillivant XR** y **QuilliChew ER**, siga el plan de dosificación paso a paso de su proveedor de atención médica para el nuevo medicamento. Las dosis de QuilliChew ER y Quillivant XR no son directamente intercambiables.



¡Únase a nuestra comunidad!



**Visite nuestros sitios web
y suscríbase a nuestro
boletín de noticias**

quillivantXR.com

quillichewER.com



Conéctese en Facebook

[Quillivant XR](#)

[QuilliChew ER](#)

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).

Para personas a partir de los 6 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)



Administración constante del medicamento para el TDAH⁵ Control efectivo de los síntomas del TDAH^{6,7}



Los pacientes elegibles pagan
tan solo **\$25** cada mes*

Descubra cómo puede pagar
tan solo **\$25 por su receta
médica en trissavingscard.com**

Envíe TRIS a TRIS4U (874748) para
obtener una Tarjeta de Ahorro Móvil**.

* Se aplican términos y condiciones. La emisión de la tarjeta está sujeta a los requisitos.

** Términos y condiciones para la opción móvil: TrisSavingsCard.com/terms. Pueden aplicarse tarifas por mensajes y datos.

Referencias: **1.** Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). What is ADHD. <https://cdc.gov/adhd/about> **2.** Danielson ML, Claussen AH, Bitsko RH, Katz SM, Newsome K, Blumberg SJ, Kogan MD, Ghandour R. ADHD Prevalence Among U.S. Children and Adolescents in 2022: Diagnosis, Severity, Co-Occurring Disorders, and Treatment. J Clin Child Adolesc Psychol. Mayo y junio del 2024; 53(3):343-360. **3.** Schein J, Childress A, Adams J, Gagnon-Sanschagrin P, Maitland J, Qu W, Cloutier M, Guérin A. Treatment patterns among children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder in the United States - a retrospective claims analysis. BMC Psychiatry. 2022 Aug 18;22(1):555. **4.** The World Federation of ADHD guide [electronic resource]/Editors, Luis Augusto Rohde [et al] – Porto Alegre: Artmed, 2019. **5.** Cutler AJ, Hanaie J. Understanding the delivery technology used in ADHD stimulant medications can help to individualize treatment. CNS Spectrums. 2025;30(1):e30. **6.** Wigal SB, Childress A, Berry SA, et al. Efficacy and safety of a chewable methylphenidate extended-release tablet in children with attention deficit/ hyperactivity disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2017;27(8):690-699. **7.** Wigal SB, Childress AC, Belden HW, Berry SA. NWP06, an extended-release oral suspension of methylphenidate, improved attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms compared with placebo in a laboratory classroom study. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013;23(1):3-10. **8.** Quillivant XR [prospecto del envase]. Tris Pharma, Inc., Monmouth Junction, NJ. **9.** Abbas R, Childress AC, Nagraj P, Rolke R, Berry SA, Palumbo DR. Relative bioavailability of methylphenidate extended-release chewable tablets chewed versus swallowed whole. Clin Ther. 2018;40(5):733-740. **10.** QuilliChew ER [prospecto del envase]. Tris Pharma, Inc., Monmouth Junction, NJ.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional completa y la [Información Completa de Prescripción](#), incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA sobre ABUSO, USO INDEBIDO y ADICCIÓN, y la [Guía del Medicamento](#).



Quillivant XR y QuilliChew ER son marcas comerciales registradas de NextWave Pharmaceuticals, Inc.
© 2026 Tris Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. QUI_ER.ES.2328.PR 02/26